

注意報!

スイカ病害虫防除

JA山武郡市

降雨が続くと「果実腐敗症（褐色腐敗病）」が発生します。特に、短時間に多量の雨が降り、ベット面が冠水しやすいトンネル栽培は要注意です。数年前に、降雨時の収穫された西瓜において発生した経緯がありますので注意して下さい。（病原菌は水媒伝染する）

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前日数)	総使用回数	予防効果	治療効果	浸透移行性
ホライズンドライフフロアブル	2500倍	前日まで	3回以内	○	○	◎
ランマンフロアブル	1000倍	前日まで	4回以内	◎	△	×
レーバスフロアブル	2000倍	前日まで	2回以内	◎	○	○

収穫間近になると樹勢が低下して、うどんこ病が発生しやすくなります。発生が見られたら蔓延する前に株元に集中的に散布して下さい。

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前日数)	総使用回数	予防効果	治療効果	浸透移行性
ガッテン乳剤	5000倍	前日まで	2回以内	◎	○	△
トリフミン水和剤	3000倍	前日まで	5回以内	○	○	○
シグナムWDG	1500倍	前日まで	3回以内	◎	○	○

害虫

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前日数)	総使用回数	対象害虫
アファーム乳剤	1000倍	前日まで	3回以内	同系統
プレバソソフロアブル	2000倍	前日まで	3回以内	
フェニックス顆粒水和剤	2000倍	前日まで	2回以内	
カスケード乳剤	2000倍	7日前まで	4回以内	

表皮食害対策
表皮食害対策
表皮食害対策
表皮食害対策

※ ひとりじめボンボン生産者は、特に表皮食害対策を徹底して下さい。