

平成30年3月23日

西瓜生産者 各位

芝山経済センター

菌核病の発生が懸念される時期となりますので、下記の薬剤での防除徹底をお願い致します。

散布剤の使用方法和特性

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前日数)	総使用回数	予防効果	治療効果	浸透移行性
カンタスドライ フロアブル	1000倍	前日まで	3回以内	◎	△	△
スミレックス水和剤	1000倍	7日前まで	5回以内	○	○	○
ロブラール水和剤	1000倍	前日まで	4回以内	○	○	○
ベルコートフロアブル	1000倍	前日まで	4回以内	○	△	×
スミブレンド水和剤	2000倍	21日前まで	5回以内	○	○	○

くん煙剤の使用方法和比較

薬剤名	使用量	使用時期 (収穫前日数)	総使用回数	くん煙時間	価格 (規格)	1000㎡当り 費用
スミレックスくん煙剤	50㎡当り6g (1000㎡当り120g)	7日前まで	5回以内	10～15時間	1,280円 (50g)	3,072円
ロブラールくん煙剤	200㎡当り100g (1000㎡当り500g)	前日まで	4回以内	12時間以上	4,887円 (50g × 10)	4,887円

注意: スミレックス・スミブレンド・スミレックスくん煙剤は同一成分が含まれるため、合計した総使用回数で5回以内となります。