

ねぎのさび病・べと病の発生にご注意下さい

平成 30 年 3 月 6 日

JA山武郡市
山武農業事務所

2月29日の未明から3月1日の朝にかけての大雨、強風、その後の高温により、さび病やべと病が発生しやすい気象条件になっています。

さび病・べと病の初期症状は畑に入らないとわかりません。早めに予防剤を散布することで被害を未然に防ぎましょう。また、一部ほ場では、2月下旬にさび病が発生していました。発生がみられるところでは、すでに感染が拡大しているおそれがありますので、治療剤を散布し、病原菌の密度を低下させて下さい。

ネギべと病、さび病に登録のある主な殺菌剤

べと病	さび病	薬剤名	効果	希釈倍率	使用時期	総使用回数
	●	カリグリーン	治療	800倍	収穫前日まで	-
	●	アフェットフロアブル	予防	2000倍	収穫前日まで	2回以内
	●	サブロール乳剤	治療	800~1000倍	収穫前日まで	5回以内
●		ランマンフロアブル	予防	2000倍	収穫3日前まで	4回以内
●	●	アミスター20フロアブル	予防・治療	2000倍	収穫3日前まで	4回以内
●	●	ヨネポン水和剤	予防	500倍	収穫7日前まで	4回以内
●		レーバスフロアブル	予防・治療	2000倍	収穫7日前まで	2回以内
	●	オンリーワンフロアブル	治療	1000倍	収穫14日前まで	3回以内
●	●	ジマンダイセン水和剤	予防	600倍	収穫14日前まで	マンゼブ 合計3回以内
●	●	テーク水和剤	予防・治療	600倍	収穫14日前まで	
●	●	ダコニール1000	予防	1000倍	収穫14日前まで	TPN 合計3回以内
●		プロポーズ顆粒水和剤	予防・治療	1000倍	収穫14日前まで	
●		フォリオゴールド	予防・治療	800~1000倍	収穫14日前まで	TPN 合計3回以内 メタラキシル 合計3回以内
●		リドミルゴールドMZ	予防・治療	1000倍	収穫30日前まで	マンゼブ 合計3回以内 メタラキシル 合計3回以内

農薬の使用にあたっては、ラベルをよく確認し、希釈倍数、使用時期、総使用回数に十分注意して下さい。



さび病



べと病(畑の外から)



べと病(畑の中)