

西瓜生産者 各位

平成30年4月13日

芝山経済センター

高温・乾燥が続いており、ハダニ類やアブラムシの発生が懸念されます。下記の薬剤を散布し、防除に努めましょう。

【ハダニ類防除】

ハダニ類は、下葉や株元から発生し、葉裏に寄生しています。薬剤は、葉裏にも届くように散布しましょう。また、薬剤抵抗性が発達しやすいので、ローテーション散布を心がけましょう。

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前日数)	総使用回数	ミツバチへの 影響日数	作用特性	備考
バロックフロアブル	2000倍	前日まで	2回以内	1日	卵～幼虫	遅効的で残効長い
スターマイトフロアブル	2000倍		1回		卵～成虫	速効的
ダニサラバフロアブル	1000倍		2回以内			スターマイトフロアブルと同系統
マイトコーネフロアブル	1000倍		1回			速効的
ダブルフェイスフロアブル	2000倍		1回			ダニトロンと新成分の混合剤

【アブラムシ類防除】

多発すると、葉が縮れます。ミツバチへの影響日数を考慮して、薬剤を選定しましょう。

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前日数)	総使用回数	ミツバチへの 影響日数	備考
ウララDF	2000倍	前日まで	2回以内	1日	吸汁阻害、浸透移行性あり。残効長い
モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	3日前まで	3回以内		アザミウマにも登録あり。
モベントフロアブル	2000倍	前日まで	3回以内		ハダニ類、アザミウマ類も登録あり。 交配中には使用しないこと！
チェス顆粒水和剤	5000倍	3日前まで	4回以内		遅効的で残効長い。