

雑草別の中後期除草剤

《ノビエの取りこぼし》

- ・クリンチャーEW（展着剤添加）

移植後 20 日～ノビエ 6 葉期 但し、収穫 30 日前迄／湛水又は落水散布／100m l /10a

（希釈水量 25～100L）

- ・クリンチャー1^キ粒剤

移植後 7 日～ノビエ 4 葉期 但し、収穫 30 日前迄／湛水散布／1 k g /10a

※1.5 kg 使用の場合は、移植後 25 日～ノビエ 5 葉期 但し、収穫 30 日前迄

- ・ヒエクリーン 1^キ粒剤

移植後 15 日～ノビエ 4 葉期 但し、収穫 45 日前迄／湛水散布／1 k g /10a

《ノビエ+広葉・カヤツリグサ科雑草》

- ・レブラス 1^キ粒剤（ホタルイ、クログワイ）

移植後 14 日～ノビエ 4 葉期 但し、収穫 60 日前迄／湛水散布／1 k g /10a

- ・クリンチャーバス ME 液剤

移植後 15 日～ノビエ 5 葉期 但し、収穫 50 日前迄／※落水散布／1000m l /10a

《広葉・カヤツリグサ科雑草のみ（ノビエ対象外）》

- ・バサグラン液剤（オモダカ、クログワイ）

移植後 15～55 日 但し、収穫 50 日前迄／※落水散布／500～700m l /10a

（希釈水量 70～100L）

- ・バサグラン粒剤（3kg）（オモダカ、クログワイ）

移植後 15～55 日 但し、収穫 60 日前迄／※落水散布／3～4 kg /10a

《雑草全般の取りこぼし》

- ・アクシズ MX1^キ粒剤（オモダカ、クログワイ）

移植後 7 日～ノビエ 4 葉期 但し、収穫 45 日前迄／湛水散布／1 k g /10a

- ・アトトリ 1^キ粒剤（オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ）

移植後 20 日（稲 5 葉期以降）～ノビエ 4 葉期 但し、収穫 45 日前迄／湛水散布／1 k g /10a

- ・ワイドアタック SC（オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ）

移植後 20 日（稲 5 葉期以降）～ノビエ 6 葉期 但し、収穫 30 日前迄／※落水散布／100m l /10a

（希釈水量 100L）