

秋冬ニンジンの黒葉枯病・害虫防除

今後、黒葉枯病等の発生が懸念されます。
発病後の防除は効果が劣るので、葉が繁茂する前に茎葉にしっかりとかかるように下記の薬剤を散布してください。

1 回目は本葉 4～6 枚、2 回目は本葉 8～9 枚の時期を目安に防除しましょう。

また、ハスモンヨトウなどの害虫も散見されますので、あわせて防除を行いましょう。

【黒葉枯病防除】

薬剤名	特性	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
Zボルドー	予防	500 倍	—	—
ベルコート水和剤	予防	500～1000 倍	14 日前まで	5 回以内
カスミンボルドー	予防 治療	1000 倍	7 日前まで	2 回以内
ポリオキシシン AL 水和剤	予防 治療	500 倍	7 日前まで	5 回以内
ストロビーフロアブル	予防 治療	2000～ 3000 倍	7 日前まで	3 回以内

【害虫防除】

薬剤名	対象害虫	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
アフーム乳剤	ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ	2000 倍	前日まで	3 回以内
コテツフロアブル	ヨトウムシ キアゲハ	2000 倍	前日まで	2 回以内
ゼンターリ顆粒水和剤	ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000 倍	前日まで	—

☆雑草が残った圃場ではニンジン本葉 3～5 枚時にロロックス（100～150g/10a、収穫 30 日前まで、1 回）を散布しましょう。